

## Methylene Chloride + 초임계 이산화탄소 혼합물에서의 난용성 약물의 용해도

오세균, 이병철\*, 황성주<sup>1</sup>  
한남대학교 나노생명화학공학과;  
<sup>1</sup>충남대학교 약학대학 제약학과  
(bclee@mail.hannam.ac.kr\*)

본 연구에서는 methylene chloride와 같은 물질을 용매로 사용하고 초임계 상태의 이산화탄소 (CO<sub>2</sub>)를 역용매로 사용하여 난용성 약물 (water-insoluble drugs)을 미세입자로 제조함으로써 약물의 생체이용률을 향상시킬 수 있는 초임계 역용매 재결정 (supercritical anti-solvent recrystallization) 공정을 개발하기 위해 필수적으로 요구되는 기초 연구로서, 공정에서 사용되는 유기용매와 초임계 상태의 이산화탄소 역용매의 혼합물에서의 난용성 약물의 용해도, 즉 상거동을 관찰하였다. 난용성 약물로는 simvastatin, atrovastatin, lovastatin을 사용하였으며, variable-volume view cell이 장착된 고압용 상평형 장치를 사용하여 고정된 온도와 혼합 용매의 조성에서 cloud point pressure, 즉 이중상과 단일상의 경계 압력을 측정함으로써 혼합용매에서의 난용성 약물의 용해도를 측정하였다. 30, 40, 50 C의 온도에서 methylene chloride와 초임계 CO<sub>2</sub> 혼합용매의 조성이 cloud point pressure에 미치는 영향을 관찰하였다. 온도가 증가함에 따라 cloud point pressure는 증가하였으며, 혼합용매 중 CO<sub>2</sub>의 조성이 증가함에 따라 cloud point pressure는 급격히 증가하여 이중상의 영역이 확대되었다.